

*SUR DIVERS REPTILES DE KEBILI (SUD-TUNISIEN)*

RECUEILLIS PAR M. LE COMMANDANT VIBERT,

PAR M. PAUL CHABANAUD.

Les Reptiles qui font l'objet de cette note ont été envoyés au Muséum en 1910. Ils sont au nombre de 12 individus, répartis en 6 espèces.

Tous les exemplaires qui composent cette petite collection ont été malheureusement plongés dans un alcool trop fort qui a amené une légère altération de leur couleur. Malgré ce fait évident, l'action décolorante de l'alcool ne suffit pas à expliquer l'aspect généralement pâle qu'ils présentent tous, bien qu'à des degrés divers; aussi faut-il admettre, je crois, et jusqu'à preuve du contraire, que cette coloration particulière est due à l'influence locale.

LACERTILIENS.

*STENODACTYLUS GUTTATUS* Cuv. — 2 exemplaires.

*TARENTOLA MAURITANICA* Linn. — 1 exemplaire de taille moyenne qui pourrait être rapporté à la var. *deserti* Boul. en raison de la forme allongée de sa tête, et aussi de sa coloration d'un blanc jaunâtre uniforme. Toutefois les granulations dorsales, entre les tubercules, sont aussi grosses, peut-être même plus grosses sur le milieu du dos, que celles des exemplaires typiques. Cet individu pourrait donc être considéré comme intermédiaire entre la *forma typica* et la var. *deserti* Boul.; opinion qui, si elle venait à être confirmée, ne permettrait plus de maintenir *T. deserti* Boul. comme variété distincte.

N'ayant encore eu sous les yeux aucun individu appartenant d'une façon indubitable à la variété en question, je ne puis me prononcer.

*AGAMA INERMIS* Reuss. — 2 exemplaires.

*ACANTHODACTYLUS BOSKIANUS* Daud. — 1 exemplaire.

*A. SCUTELLATUS* Aud. — 2 exemplaires.

*CHALCIDES BOULENGERI* Anderson. — 3 exemplaires, dont aucun ne correspond exactement à la diagnose de l'auteur; l'un d'eux présente la cinquième

labiale supérieure bordant l'œil, à gauche, et la quatrième à droite; 28 rangs d'écaillés autour du milieu du corps. Les deux autres présentent le caractère normal de la cinquième labiale bordant l'œil, mais possèdent respectivement l'un 26 rangs d'écaillés et l'autre 24.

Franz Werner avait déjà signalé (*Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, XLVII [1897], p. 405) la présence de 24 rangs d'écaillés chez un certain nombre d'exemplaires de Tunisie, ainsi que le fait, pour l'un d'eux, d'avoir la cinquième labiale bordant l'œil d'un seul côté, et la quatrième de l'autre.

Chez cette espèce, les caractères tirés de l'écaillure sont donc beaucoup plus variables que chez *Ch. sepoides* Aud. dont elle est très voisine, bien que nettement distincte, comme l'indique d'ailleurs clairement la description de l'auteur. Il se pourrait que l'on rencontrât des exemplaires de *Ch. Boulengeri* dont la quatrième labiale supérieure borderait l'œil de chaque côté et qui n'auraient en même temps que 24 rangs d'écaillés autour du milieu du corps; caractères identiques à ceux de *Ch. sepoides*. Dans ce cas, la forme du museau, bien plus proéminent en avant, au-dessus de la bouche, moins large et moins arrondi en avant, la position des narines au-dessus de la suture entre la rostrale et la première labiale supérieure, position consécutive au fait que les bords latéraux de la rostrale sont moins prolongés en arrière, les internasales nettement soudées ensemble, les yeux relativement un peu plus grands, l'orifice auditif plus allongé et placé plus bas par rapport à la bouche, de telle sorte que la commissure des lèvres se trouve située au niveau de son milieu, tandis que, chez *sepoides*, cette commissure aboutit à l'extrémité inférieure de la fente auditive qu'elle touche presque, la coloration, etc., permettraient d'éviter aisément la confusion.

Cette intéressante espèce, qui n'a encore été rencontrée qu'en Tunisie, où elle semble remplacer *Ch. sepoides*, est nouvelle pour les collections du Muséum.

#### OPHIDIENS.

*MACROPROTODON CUCULLATUS* Geoffr. — 1 exemplaire d'une coloration très remarquable : entièrement d'un blanc à peine jaunâtre avec les taches du dos presque indistinctes; celles du ventre bien marquées, mais confluentes presque partout et formant une ligne sinueuse depuis la gorge jusqu'à l'extrémité de la queue; tête entièrement d'un noir de poix avec, sous la bouche, une tache blanche en forme de fer de lance.